

Merci d'avoir téléchargé cette liste de questions, elles vous sont fournies par le site [prevenirpurlavenir.fr](http://prevenirpurlavenir.fr), édité par Janssen-Cilag.  
Les informations ci-dessous sont à but informatif uniquement, si vous souhaitez plus d'informations, rapprochez-vous de votre médecin traitant.

Pour en savoir plus sur "Prévenir pour l'avenir", connectez-vous au site [prevenirpurlavenir.fr](http://prevenirpurlavenir.fr), ou rejoignez notre communauté facebook sur "[Stop au Sida](#)".

## Mon compagnon est sous traitement antirétroviral et veut l'arrêter car il se sent beaucoup mieux. Quels sont les risques ?

Attention, en cas d'arrêt du traitement - même après l'avoir suivi pendant des années – le virus se réactive et se multiplie de nouveau. On peut perdre en quelques semaines les bénéfices d'années de traitement. Il est donc essentiel de suivre scrupuleusement son traitement, c'est-à-dire de se montrer observant. En aucun cas, l'arrêt du traitement ne doit être décidé par le patient sans en avoir discuté avec son médecin<sup>(1)</sup>.

(1) "L'observance", Actions Traitements, consulté le 29 octobre 2019, <https://www.actions-traitements.org/info-traitements/observance/>

**Pour en savoir plus**, veuillez consulter la page "[Guérit-on du VIH ? D'une IST ?](#)"

---

Pour toute question complémentaire, merci de contacter le laboratoire Janssen au numéro vert suivant :

# Janssen

Information médicale, Pharmacovigilance, Réclamations qualité,  
Informations logistiques et commerciales, Approvisionnements d'urgence

**0 800 25 50 75** Service & appel gratuits

Depuis les DROM-COM et l'étranger : +33 (0) 1 55 00 40 03  
Accessible 24h/24 et 7j/7 pour les appels urgents

euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 562 033 068 et ayant son siège social au 1 rue Camille Desmoulins, 92787 Issy Les Moulineaux, TSA 91003 - FRANCE Cedex 9.